

比較表

薬剤名	ケサンラ (一般名:ドナネマブ)	レケンビ (一般名:レカネマブ) 2024年2月より投与中				
適応疾患	「アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)」と「アルツハイマー病による軽度の認知症」に対する薬です					
ターゲット	主としてアミロイドβプラークに作用		主としてアミロイドβプロトフィブリルに作用			
薬剤のはたらきと効果	脳のアミロイドβにくっつくことで、異物を排除する細胞のミクログリアを引き寄せ、アミロイドβを取り除きます。その結果アミロイドβが減り、アルツハイマー病の進行が遅くなることが期待され、認知機能が緩やかになることが期待されます。					
MMS検査	20点以上		22点以上			
投与時間	約1時間かけて4週間ごとに投与		約1時間かけて2週間ごとに投与			
投与期間	最長投与期間 18ヵ月					
アミロイドPET検査	12ヵ月・18ヵ月を目安		—			
MRI検査	2.3.4.7.14回目を目安		5.7.14回目を目安			
投与期間終了の判断	アミロイドPET検査でアミロイドβプラークの除去が確認されると投与完了		投薬中6ヵ月ごと、投与開始後18ヵ月目に医師が症状に基づき薬の効果や病気の進み具合を確認し、継続、中止の判断			
その他	副作用の発現状況を評価し、医師が中止を判断する場合があります					
投与量	3回目まで700mg 4回目以降1400mg		体重によって決定			
費用	1割負担	1~3回目	約15,000円	1割負担	200mg	約5,000円
		4回目以降	約30,000円		500mg	約12,000円
	3割負担	1~3回目	約40,000円	3割負担	200mg	約15,000円
		4回目以降	約80,000円		500mg	約36,000円

医師と相談して薬剤を選択する事ができます。